



Impfkalender

Nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut/Stand Juli 2008

Impfung	Alter in vollendeten Monaten					Alter in vollendeten Jahren				
	2	3	4	11-14	15-23 (siehe a)	5-6 (siehe a)	9-11 (siehe a)	12 – 17 (siehe a)	ab 18	≥ 60
Diphtherie	1.	2.	3.	4.		A	A		A (d)	
Wundstarrkrampf (Tetanus)	1.	2.	3.	4.		A	A		A (d)	
Keuchhusten (Pertussis)	1.	2.	3.	4.		A	A			
Haemophilus influenzae	1.	2. (e)	3.	4.						
Kinderlähmung (Poliomyelitis)	1.	2. (e)	3.	4.			A			
Hepatitis B	1.	2. (e)	3.	4.			G			
Pneumokokken		1.	2.	3.	4.					
Meningokokken					1. (b)					
Mumps, Masern, Röteln				1.	2.					
Windpocken (Varizellen)				1.	2. (f)					
HPV (Humane Papillomaviren)								SM		
Grippe (Influenza) (c)										S

A: Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis erfolgen; **G:** Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes; **S:** Standardimpfungen mit allgemeiner Anwendung = Regelimpfungen; **SM:** Standardimpfungen für Mädchen

- a) Zu diesen Zeitpunkten soll der Impfstatus unbedingt überprüft und gegebenenfalls vervollständigt werden.
- b) Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat
- c) Jährlich mit aktuellem Impfstoff
- d) Auffrischung alle 10 Jahre
- e) Bei Einzelimpfstoffen oder Impfstoffen ohne Keuchhustenanteil kann diese Dosis entfallen.
- f) Bei Verwendung eines MMR-Varizellenimpfstoffes: Gabe einer zweiten Dosis bevorzugt nach 6 Wochen (mindestens 4 Wochen)